

---

## 多维随机变量及其分布函数

### 一、作业 (提交时间: Nov. 6, 2023)

1. [75-1/81-1] 一个箱子中装有 100 件同类产品, 其中一、二、三等品分别有 70, 20, 10 件. 现从中随机抽取一件, 试求:

(1)  $(X_1, X_2)$  的联合分布列, 其中

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{如果抽到 } i \text{ 等品} \\ 0, & \text{如果抽到非 } i \text{ 等品} \end{cases} \quad i = 1, 2;$$

(2) 分别求  $X_1, X_2$  的边缘分布列.

2. [78-6/85-6] 设  $(X, Y)$  的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} c(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数  $c$  的值;

(2) 求概率  $P(X + Y < 4)$ ;

(3) 求概率  $P(X < 1 | X + Y < 4)$ ;

(4) 计算  $X, Y$  的边缘密度函数.

3. [80-2/90-3] 设  $(X, Y)$  的服从区域  $G$  上的均匀分布, 其中  $G$  由直线  $y = -x, y = x$  与  $x = 2$  所围成. 求:

(1)  $(X, Y)$  的联合密度函数;

(2) 概率  $P(X + Y < 2)$ ;

(3)  $X, Y$  的边缘密度函数.

4. [87-10] 设区域  $G$  为: 由  $(0, 0), (1, 1), (0, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, 1)$  为顶点的四边形与以  $(\frac{1}{2}, 0), (1, 0), (1, \frac{1}{2})$  为顶点的三角形合成, 而  $(X, Y)$  服从区域  $G$  上的均匀分布. 求:

(1)  $(X, Y)$  的联合密度函数;

(2)  $X, Y$  的边缘密度函数.

### 二、练习

1. [76-2/82-2/89-2] 两名水平相当的棋手弈棋三盘. 设  $X$  表示某名棋手获胜的盘数,  $Y$  表示他输赢盘数之差的绝对值. 假定没有和棋, 且每盘结果相互独立. 试求:

(1)  $(X, Y)$  的联合分布列;

(2) 分别求  $X, Y$  的边缘分布列.

2. [79-7/85-7] 设  $(X, Y)$  的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数  $c$  的值;

(2) 求概率  $P(X < 1, Y > 2)$ ;

(3) 求  $X, Y$  的边缘密度函数.

3. [78-5] 假设随机变量  $Y$  服从参数为  $\lambda = 1$  得指数分布, 随机变量

$$X_k = \begin{cases} 1, & Y > k \\ 0, & Y \leq k \end{cases} \quad k = 1, 2;$$

求  $(X_1, X_2)$  的联合分布列.

4. [79-8/86-8] 设  $(X, Y)$  的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中, 区域  $G = \{(x, y) : 0 < y < 2x \text{ 且 } 0 < x < 2\}$ .

- (1) 求常数  $c$  的值;
- (2) 求概率  $P(X + Y < 1)$ ;
- (3) 求  $X, Y$  的边缘密度函数.

5. [80-1] 设  $(X, Y)$  服从以原点为圆心的单位圆上的均匀分布, 记

$$U = \begin{cases} 1, & X + Y \leq 0 \\ 0, & X + Y > 0 \end{cases}$$

$$V = \begin{cases} 1, & X - Y \leq 0 \\ 0, & X - Y > 0 \end{cases}$$

求  $(X_1, X_2)$  的联合分布列.

### 三、加强

1. [82-1.2] 设二维连续型随机变量  $(X_1, X_2)$  与  $(Y_1, Y_2)$  的联合密度分别为  $p(x, y)$  和  $g(x, y)$ . 令  $f(x, y) = ap(x, y) + bq(x, y)$ , 要确保  $f(x, y)$  是某个二维随机变量的联合密度函数, 则  $a, b$  需要满足何种数量关系?

2. [83-1.4] 盒子里装有 3 只黑球、2 只红球、2 只白球, 在其中任选 4 只球, 以  $X$  表示取到黑球的数量, 以  $Y$  表示取到红球的数量, 求  $X$  和  $Y$  的联合分布列.

3. [85-1.7] 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求  $P(X + Y \leq 1)$ .

4. [87-2.2] 设离散型随机变量的分布列且满足  $P(X_1 X_2 = 0) = 1$ . 求  $P(X_1 = X_2)$ .

|                        |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|
| $X_i (i \in \{1, 2\})$ | -1   | 0    | 1    |
| 概率                     | 0.25 | 0.50 | 0.25 |

5. [88-2.3] 设随机变量  $Y \sim U(0, 3)$ , 随机变量  $X$  满足

$$X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k \\ 1, & Y > k \end{cases} \quad (k = 1, 2)$$

求  $(X_1, X_2)$  的联合概率分布和边缘分布.